

Новый вид рода *Nikanoria* Nikolskaja, 1955
(Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae)
из Объединенных Арабских Эмиратов

A new species of the genus *Nikanoria* Nikolskaja, 1955
(Hymenoptera: Chalcidoidea: Eurytomidae)
from United Arab Emirates

М.Д. Зерова
M.D. Zerova

Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена Национальной Академии наук Украины, ул. Богдана Хмельницкого 15, Киев 01601 Украина. E-mail: zerova@izan.kiev.ua.

I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Bogdan Khmelnytsky Str. 15, Kiev 01601 Ukraine.

Ключевые слова: паразитоиды, Hymenoptera, Eurytomidae, *Nikanoria*, новый вид, Объединенные Арабские Эмираты.

Key words: parasitoids, Hymenoptera, Eurytomidae, *Nikanoria*, new species, United Arab Emirates.

Резюме. Приведено иллюстрированное описание нового вида из Объединенных Арабских Эмиратов — *Nikanoria leleji* sp.n. (Eurytomidae), самки которого наиболее близки к самкам *N. violacea* Zerova.

Abstract. A new Eurytomidae species from the United Arab Emirates, *Nikanoria leleji* sp.n., is described and illustrated. The females of new species are the most similar to *N. violaceae* Zerova.

Описываемый в данной статье новый вид *Nikanoria leleji* sp.n. дополняет ранее опубликованную сводку [Зерова, 2013 (Zerova, 2013)] видов рода *Nikanoria* Nikolskaja, 1955 мировой фауны. Вид описан по сборам А. ван Хартена (Antonius van Harten), проведенным в 2006 г. на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Nikanoria leleji Zerova, sp.n.

Рис. 1–4.

Типовой материал. Голотип: самка, «United Arab Emirates, N of Ajman, water traps, 16.09.2006 (A. van Harten)». Паратипы: 2 самки, с этикеткой как у голотипа; 1 самец, «UAE, Sharjah-Khor, Kalba, near tunnel, light trap, 31.05.2006 (A. van Harten)». Голотип и паратипы хранятся в коллекции Института зоологии НАН Украины (Киев).

Описание. Самка (голотип). Длина тела 1.3 мм. Тело плотное, с выпуклой мезосомой и округлым брюшком (вид сбоку). Голова и мезосома черные с легким фиолетовым отблеском, брюшко черное с коричневатым оттенком. Усики со светло-желтым основным члеником и желтыми 1–5 члениками жгутика, булава черная. Крылья бесцветные, жилки светло-желтые.

Ширина головы сверху в 2,3 раза больше ее длины (35 : 15); виски по длине равны глазу; POL почти в 3,0 раза больше OOL (11 : 4). Ширина голова спереди больше ее высоты (35 : 26); длина щеки равна продольно-

му диаметру глаза; внешний край наличника ровный; лицевая впадина мелкая, с закругленными боковыми краями. Усики причленяются посередине лица; основной членик не выпуклый, не достигает уровня среднего глазка; поворотный членик чуть длиннее первого членика жгутика (12 : 10); жгутик несколько расширяется к вершине, длина его 1-го членика больше ширины (10 : 7), 5-й членик поперечный (18 : 8). Усики очень светлые, почти белые, булава черная. Лицо без опушения, в очень мелкой ячеистой скульптуре.

Мезосома выпуклая, округлая (вид сбоку), с сильно скошенным промежуточным сегментом. Переднеспинка сравнительно широкая, ее ширина почти в 3,0 раза больше длины, с очень маленькими желтоватыми пятнами на верхних боковых углах; щит среднеспинки по длине равен щитику; дорсальная поверхность груди с мелкоячеистой скульптурой; опушение не развито, лишь на щитике заметно несколько коротких белых волосков. Бока среднегруди в очень мелкой крапчатой скульптуре. Промежуточный сегмент очень мелко ячеистый. Задние тазики с очень мелкой крапчатой скульптурой, передние и средние тазики без ясной скульптуры. Передние крылья в базальной трети голые, на остальной части с очень коротким, светлым и редким опушением; маргинальная жилка короче постмаргинальной (14 : 27); ширина стигмы несколько меньше ее высоты (14 : 19).

Метасома (вид сбоку) округлая, незначительно длиннее мезосомы (28 : 24). Стебелек очень короткий, чешуевидный; тергиты 2–5 слабо различаются по длине, 6-й тергит в 2,0 раза короче 5-го; эпипигий в 1,5 раза длиннее 6-го тергита, почти вертикально приподнят кверху. Яйцеклад незначительно выступает за вершину брюшка.

Изменчивость. Изменчивость основных признаков у паратипов не выявлена.

Самец. Длина тела 1,3 мм. Отличается от самки следующими признаками. Усики полностью желтые. Первый членик жгутика заметно длиннее каждого из последующих; его длина значительно больше ширины (17 : 7); дли-




Рис. 1–4. *Nikanoria leleji* sp.n.: 1 — самка, вид сбоку; 2 — самец, вид сбоку; 3 — усик самки; 4 — часть жилкования переднего крыла.

Figs 1–4. *Nikanoria leleji* sp.n.: 1 — female, lateral view; 2 — male, lateral view; 3 — female antenna; 4 — part of fore wing venation.

на 2–4-го члеников заметно больше их ширины (11 : 7); все членики и булава в редком, но сравнительно длинном опушении, длина волосков на 1–4-м члениках превышает их ширину (13 : 11); опушение булав более короткое. Стебелек метасомы приблизительно равен 2/3 длины задних тазиков (вид сбоку). Метасома слабо удлинённая, по длине (вид сбоку) равна мезосоме.

Сравнительный диагноз. Новый вид относится к группе видов *Nikanoria nigra* [Зерова, 2013 (Zeroва, 2013)]. Самки нового вида *N. leleji* sp.n. отличаются от самок всех известных видов этого рода черной окраской булав уса. По морфологическим особенностям новый вид наиболее близок к *N. violacea* Zeroва [Зерова, 1971 (Zeroва, 1971)], от которого отличается круто загнутой вверх эпипигиумом метасомы, заметно более короткими члениками жгутика обоих полов и прямым (без вырезки) внешним краем наличника.

Comparative diagnosis. A new species belongs to the *Nikanoria nigra* species group [Zeroва, 2013]. Females of *N. leleji* sp.n. differ of all other *Nikanoria* species by a black colour of the antennal club. Morphologically this new species

is the most similar to *N. violacea* Zeroва [Zeroва, 1971], but differs from it by a more abruptly upturned epipygium of metasoma, distinctly shorter funicular segments of antenna in both sexes, and a straight (without incisure) anterior margin of clypeus.

Благодарности

Все представленные в данной работе фотографии выполнены С.А. Симутником, за что автор ему очень благодарен.

Литература

- Zeroва M.D. 1971. [New chalcid species of the genus *Nikanoria* Nik. (Hymenoptera, Eurytomidae) from Middle Asia and Mongolia] // Entomologicheskoe Obozrenie. Vol.50. No.1. P.147–159. [In Russian].
- Zeroва M.D. 2013. [Review of species of the genus *Nikanoria* (Hymenoptera, Eurytomidae) of the World fauna]. Kiev: Naukova Dumka. 130 p. [In Russian].

Поступила в редакцию 27.03.2016